

## どんな人が治療対象ですか？

ケサンラ®による治療の対象は

**「アルツハイマー病による軽度認知障害**

**または軽度の認知症」**に限定されていま

す。初診時の診察および検査（通常、神経心理学的検査、認知症の重症度評価尺度、脳MRI、髄液検査またはアミロイドPET-CTなど）の結果、判定されます。


対象外と判定された場合は、他の治療のご提案をさせていただきます。

受診を希望される方は、かかりつけ医へご相談の上、紹介状をご持参ください。かかりつけがなく受診を希望される方、または、相談したいことがある方は、お問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先】  
医療法人治久会 もみのき病院  
〒780-0952 高知県高知市塚ノ原6-1  
地域連携室/認知症相談室  
電話番号(直通):088-888-2227

## ◆ 当院へのアクセス

- JR高知駅商業前駅から徒歩 2分
- 高知ICより車で約15分
- 伊野ICより車で約10分



当院は認知症治療薬ケサンラ®の投与にあたり

- 脳神経外科医
- 精神科医
- 認知症ケア認定看護師
- 薬剤師
- 臨床検査技師
- 診療放射線技師
- 社会福祉士
- 作業療法士など

多職種で構成されたチームで支援しています。

## 認知症 治療薬 ケサンラ® に関する 診療のご案内

医療法人 治久会  
もみのき病院

- もっと楽しい毎日のために
- みんなで笑顔を共有し
- のうにやさしい習慣を取り入れて
- きもちも身体も元気に過ごそう

## ケサンラ®ってどんな薬？

「ケサンラ®」（一般名：ドナネマブ）は、「アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制」の効能・効果で製造販売承認を取得し、イーライリリー株式会社から発売された新薬です。アルツハイマー病の進行を抑制し、認知機能と日常生活機能の低下を遅らせることを実証し、承認されました。

4週間に1回、点滴を行います。投与期間は、「アミロイドβプラーク（脳に蓄積されるたんぱく質の塊）」の除去が確認されるまで、または除去が確認されない場合でも原則最長18カ月で完了となります

## 治療のスケジュール

### 初回受診

- ・脳神経外科、精神科の両方の医師の診察
- ・MRI検査
- ・MMSE（精神状態短時間検査）、CDR（臨床的認知症尺度）の検査
- ・髄液検査 または アミロイドPET-CT

### 2週間後 外来受診

- ・検査結果、治療適応について説明と同意
- ・「治療不適応」となった場合は、他の治療の提案や外来で定期的なフォローをしていきます

### 2週間前後 入院調整

- ・初回投与は副反応の観察の為**3泊4日**の入院となります

## どんな副反応がありますか

- ◆ 点滴に伴う反応  
点滴で薬剤を投与した後起こる反応で、**頭痛、悪寒、発熱、吐き気、嘔吐**などの症状が現れることがあります。
- ◆ アミロイド関連画像異常（ARIA）  
**脳のむくみ、脳の出血、出血した血液がかたまり付着**することが報告されています。アミロイド関連画像異常（ARIA）が見つかった場合は、追加のMRI検査を行い、重症度によってケサンラの治療の中断をすることがあります。

## 医療費について

- ◆ 高額医療制度について  
病院や薬局で支払ったひと月の自己負担額が上限額を超えた場合、その超過分を払い戻して医療費の負担を軽減する制度です。対象となる方は、保険者に申請が必要です。当院ではオンライン資格確認でも可能です。詳細は、担当者よりご説明いたします。

※アミロイドPETとは

「脳内に蓄積したアミロイドβ蛋白を可視化する画像検査」です。アミロイドβと結合する放射性医薬品を静脈注射し、陽電子放射断層撮影装置（PET）で頭部を撮影します。検査費用（1割～3割負担）：14,000～72,000円  
アミロイドPETができる医療機関は少なく、県外の医療機関で検査を行うこともあります。

投与は、**30分かけて点滴**を行います。

**2回目以降は、4週間ごとに通院**していただき、外来で投与します。

また治療開始後、**2回目、3回目、4回目、7回目、13回目、19回目の投与前に、MRI検査を実施**します。

治療開始1年後、**アミロイドPETの検査が必須**です。

また必要に応じて、医師が薬の効果や病気の進み具合などを確認し治療の継続、または中止を判断します。